



معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

موضوع: واکسیناسیون آبله مرغان در گروه های پرخطر

با سلام و احترام

با سلام و احترام

به استحضار می رساند این مرکز نسبت به تامین تعداد محدودی واکسن آبله مرغان (Varivax) برای ایمن سازی گروه های پرخطر اقدام نموده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات ذیل صورت گیرد:

- ۱ - دریافت سهمیه واکسن از سردخانه کشوری طبق جدول پیوست
- ۲ - تعیین تعدادی از مراکز بهداشتی - درمانی و آموزش کارکنان آن مراکز برای واکسیناسیون گروههای پرخطر
- ۳ - هماهنگی با بیمارستان های دارای بخش هماتولوژی، انکولوژی، عفونی، اعصاب و پیوند عضو جهت ارجاع بیماران نیازمند ایمن سازی با معرفی نامه پزشک و اعلام مراکز بهداشتی - درمانی منتخب به پزشکان محترم این بیمارستان ها.

گروه های پرخطر نیازمند ایمن سازی :

- کودکان با بیماری های بدخیم و فاقد سابقه ابتلا به آبله مرغان که در مرحله خاموشی کامل بیماری بدخیم بوده و حداقل سه ماه از قطع شیمی درمانی آن ها گذشته است. لازم به ذکر است در مورد کودکان دچار لوسمی که در مرحله خاموشی کامل بیماری هستند، واکسیناسیون باید صرفا در صورت دسترسی به داروهای ضد ویروسی (برای مقابله با عوارض احتمالی) صورت گیرد.
- کودکان HIV مثبت فاقد علامت یا با علائم خفیف نقص ایمنی و فاقد سابقه ابتلا به آبله مرغان (CD4 بیشتر یا مساوی ۲۰۰ در سن ۵ سال و بالاتر، یا CD4 بیشتر یا مساوی ۱۵٪ در سن زیر ۱۵ سال)
- اعضای خانواده گروه های پرخطر که فاقد سابقه ابتلا به آبله مرغان هستند.
- دریافت کنندگان پیوند
- بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) که تحت درمان با داروی Gilenya (Fingolimod) قرار می گیرند، در صورت سابقه منفی ابتلا به آبله مرغان یا واکسیناسیون علیه آن، باید یک ماه قبل از شروع داروی مذکور واکسن آبله مرغان را دریافت کنند.

نحوه تجویز واکسن:

- از ۱۲ ماهگی تا ۱۲ سالگی: دو دز نیم سی سی با فاصله حداقل سه ماه.

- از ۱۳ سالگی به بعد: دو دز نیم سی سی با فاصله حداقل ۴ هفته.
- تزریق **به صورت زیرجلدی** در قسمت خارجی ران یا فوقانی بازو است. معمولاً در بچه های کوچک در ران و در افراد بزرگ تر در قسمت فوقانی بازو تزریق می شود. از تزریق عضلانی یا وریدی واکسن باید اکیداً خودداری شود.
- واکسن باید در یخچال (۲-۸ درجه) نگهداری شود.
- حلال واکسن باید در حرارت زیر ۳۰ درجه نگهداری شده و از فریز کردن آن اجتناب شود.
- ویال واکسن باید در جعبه مقوایی نگهداری شده و از نور محافظت شود.
- واکسن پس از آماده سازی ترجیحاً باید بلافاصله (حداکثر طی ۳۰ دقیقه) استفاده شود.
- واکسن آبله مرغان را می توان هم زمان با سایر واکسن ها تجویز کرد. در صورت دریافت فرآورده های خونی، پلاسما، ایمونوگلوبولین انسانی یا ایمونوگلوبولین اختصاصی آبله مرغان (VZIG) ، باید تجویز واکسن به تعویق افتد. به دنبال دریافت این واکسن، هیچ نوع ایمونوگلوبولین شامل VZIG برای یک ماه نباید استفاده شود. پس از واکسیناسیون، استفاده از فرآورده های حاوی آسپرین (سالیسیلات) برای ۶ هفته ممنوع است.
- در صورت بیماری حاد شدید یا متوسط ، تجویز واکسن باید تا زمان بهبودی به تعویق افتد.
- در کودکانی که پردنیزون با دز بالا (بیش از ۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن یا بیش از ۲۰ میلی گرم در روز برای کودکان با وزن بیش از ۱۰ کیلوگرم) و یا معادل آن و به مدت طولانی (۱۴ روز یا بیشتر) به صورت روزانه مصرف می کنند، باید حداقل تا یک ماه پس از اتمام دوره درمان از تجویز واکسن آبله مرغان اجتناب کرد.
- لازم به ذکر است دستورالعمل فوق بر مبنای بروشور کارخانه سازنده (MSD) برای شماره سریال ۰۳۰۰۷۰L با تاریخ انقضای ۲۰۱۷/۱۱/۸ تدوین شده و صرفاً برای همین شماره سریال کاربرد دارد و قابل تعمیم به سایر انواع واکسن آبله مرغان نمی باشد.